



CONTRE-INDICATIONS AU PRELEVEMENT DE SANG PLACENTAIRE

Contre- indications liées à la mère

Pathologies gynéco-obstétricales

- grossesse multiple
- hydramnios
- placenta praevia recouvrant
- hématome rétro-placentaire
- terme < à 36 SA + 3j
- diabète gestationnel insuliné déséquilibré
- condylomes en cours de grossesse
- anomalie détectée à la ponction amniotique ou trophoblastique
- atcd de MFIU hors cause funiculaire et hémorragie foeto-maternelle
- syndrome Distilbène

Pathologies infectieuses actives

- sérologie HIV positive
- séroconversion toxoplasmose, CMV ou EBV en cours de grossesse
- suivi de toutes les recommandations en cas d'épidémie (Chikungunya, maladie de Chagas, West Nile Virus)
- sérologie syphilitique positive
- hépatites : Ag HBs +, HCV+
- L'Ac anti HBs + isolé correspondant à une vaccination n'est pas une CI
- **L'Ac anti HBs et l'Ac anti HBc témoins d'une infection guérie ne sont pas une contre indication (CI) au prélèvement.**
- **Hépatite A n'est pas une CI**

- **L'antibioprophylaxie préventive pendant le travail dans le cadre d'un portage du streptocoque B ou d'une valvulopathie ancienne n'est pas une CI.**

Pathologies cardio vasculaires

- HTA
- troubles du rythme cardiaque traités

Toutes les pathologies auto- immunes :

- lupus érythémateux disséminé
- maladie de Crohn
- thyroïdite de Hashimoto
- recto-colite hémorragique
- purpura thrombopénique idiopathique
- polyarthrite rhumatoïde
- spondylarthrite ankylosante
- syndrome de Gougerot-Sjögren
- dermatomyosite
- érythème noueux
- psoriasis étendu
- vitiligo
- cryoglobulinémies
- amylose
- maladie de Behcet
- maladie de Horton
- myasthénies
- sarcoïdose
- syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter

Tous les ATCD d'affections malignes à fortiori non guéries dont :

- leucémies
- lymphomes
- cancers digestifs, pulmonaires
- tumeurs cérébrales malignes
- cancer du rein, de la thyroïde, du sein
- cancer du col y compris les carcinomes in situ I et II
- épithélioma spinocellulaire
- maladie de Sérazy
- mycosis fungoïde

- syndrome de Kaposi
- mélanomes
- néoplasie dans l'enfance et l'adolescence

Pathologies endocriniennes

- diabète insipide
- DID de type 1
- DNID sauf le diabète gestationnel
- hyperaldostéronisme
- hypercholestérolémie traitée
- hyperlipidémie essentielle traitée
- insuffisance anté-hypophysaire
- hypophysectomie compensée
- insuffisance surrénalienne
- maladie de Basedow
- phéochromocytome
- syndrome de Cushing
- insuffisance thyroïdienne non contrôlée
- hyperthyroïdie
- adénome hypophysaire non guéri

Pathologie hématologique

- toute anomalie de l'hémostase dont les coagulopathies avec risque hémorragique dont la maladie de Willebrand (les antécédents thrombo emboliques ne constituent pas une CI sauf s'ils nécessitent un traitement anti-coagulant en cours)
- anomalies de l'hémogramme ne rentrant pas dans le cadre des modifications physiologiques liées à la grossesse
- recherche d'agglutinines irrégulières positive (hors anticorps naturels non hémolysants et anti-D passifs)

Les ATCD de transfusion sanguine ne constituent pas une CI

Pathologie neurologique

- épilepsie traitée
- maladie neuro-dégénérative dont maladie de Parkinson
- syndrome de Guillain-Barré datant de moins de deux ans
- sclérose en plaque
- syndrome dépressif
- sclérose latérale amyotrophique

- syndrome dépressif sévère traité
- ATCD de traitement par hormone de croissance d'origine humaine

Toutes les maladies génétiques ou anomalies génétiques constitutionnelles dont :

- syndrome de Recklinghausen
- Hémochromatose
- Maladie des globules rouges (Minkowski-Chauffard)
- Déficits enzymatiques des plaquettes, des leucocytes
- porphyrie aiguë
- myopathie
- rétinite pigmentaire
- mucoviscidose
- maladie de surcharge

Conditions sociales

- accouchement anonyme
- patiente mineure ou sous tutelle ou curatelle
- grossesse non suivie ou non déclarée
- toutes les conduites addictives (toxicomanie, alcoolisme)
- femme vivant ou ayant vécu plus de 2 ans en Angleterre
- tatouages ou percing réalisés dans les 6 mois précédents le don
- détresse sociale

Contre-indications pendant le travail

- Tout évènement anormal survenant au cours du travail, laissé à l'appréciation de l'obstétricien ou de la sage femme
- Pré maturité : terme inférieur à 36 SA + 3j
- Liquide amniotique méconial
- Rupture des membranes supérieure à 24h : sauf en l'absence de syndrome infectieux
- Hyperthermie supérieure ou égale à 38°

Contre-indications liées au fœtus ou à l'enfant

- poids inférieur à 2600 gr
- RCIU inférieur au 3^{ème} percentile
- malformations détectées pendant la grossesse par l'échographie
- malformations non détectées pendant la grossesse reconnues à la naissance
- toutes les maladies génétiques

Contre- indications liées au père

- père inconnu sauf conception PMA
- Toutes les maladies génétiques ou anomalies génétiques constitutionnelles :
 - syndrome de Recklinghausen
 - hémochromatose
 - maladie des globules rouges (Minkowski-Chauffard)
 - déficits enzymatiques des plaquettes, des leucocytes
 - porphyrie aigüe
 - myopathie
 - rétinite pigmentaire
 - mucoviscidose
 - maladie de surcharge