

# Vulve – Vagin


## Reconnaissance d'images

O. Aynaud

Cochin – Tarnier, Paris



- **Physiologiques et pseudo-physiologiques**
  
- **Lésions associées aux IST**
  - Syphilis, Herpes virus...
  - Tumeurs PVH-induit, pox virus
  
- **Dermatoses dytrophiques**
  - Lichen plan, érosif
  - Lichen scléreux
  - Paget vulvaire
  
- **Cancers**




















Lésions PVH-induit  
condylome  
néoplasie intraépithéliale






# Fréquence des types de PVH dans les lésions condylomateuses des O.G.E.



Femmes PVH

■ faiblement oncogène    ■ potentiel oncogène    ■ négatif

## Tumeur de Buschke-Löwenstein










**Prévalence de lésions cliniques OGE / col utérin**

CIN	Lésions vulvaires associées
<b>bas grade</b> <b>(125 pttes)</b>	9% condylomes 0,8% VIN
<b>haut grade</b> <b>(71 pttes)</b>	7% condylomes 6% VIN








70% des VaIN surviennent chez des patientes antérieurement traitées pour des lésions cervicales

8 – 12% d'association vagin / vulve

6 – 40% d'atteintes de la région cervico – vulvo - vaginale



Dysplasies vulvaires :

érythroplasiques, leucoplasiques, pigmentées

Papulose bowennoïde, maladie de Bowen

- PVH-induit
  
- dystrophies chroniques vulvaires
  - Lichen plan, érosif
  - Lichen scléreux
  - Paget extra mammaire


Néoplasies intraépithéliales vulvaires (VIN)



## Incidence des VIN en Ile de France



## Fréquence des néoplasies vulvaires en Ile de France selon les classes d'âge




Cohorte 1965 – 1974 l'incidence femmes < 50 ans 1,8%

1990 – 1994 l'incidence femmes < 50 ans 21% (Jones)

Entre 1985 – 1988 et 1994 – 1997 : incidence a progressé de plus de 300%  
femmes < 50 ans (Joura)

Histologie : VIN III













Age : 30 – 50 ans

50 – 70 ans

Clinique : Erythro pigmentée

Erythro leuco pigmentée

Leucokératosique, atrophique

Multi focale

Uni focale

Asymptomatique

Prurit, dyspareunie

Histologie : VIN III

VIN III

PVH (+)

PVH (+ ou -)

**Papulose bowénoïde**

**Maladie de Bowen**

**Lichen scléreux**

...

## VIN III indifférenciées

Papulose bowénoïde

Papulose extensive

Maladie de Bowen

Atypies sévères étagées

PVH (+)

## VIN III différenciées

Lichen scléreux

Lichen plan érosif

Maladie de Paget vulvaire

Atypies basales

PVH (-)



**VIN indifférenciée**

**Papulose bowénoïde**





Prurit dans 30 à 45% des cas

# Contexte d'une papulose bowénoïde ou maladie de Bowen ou VIN indifférenciée

## Antécédent pathologie génitale

- 35 à 40% des condylomes OGE (Modesitt)
- 30 à 55% un CIN (McNally)
- 8% un K du col utérin

## Association :

VIN III : 8 à 40% CIN III  
17,5% VaIN III  
(Sykes) (Penna) (Lara-Torre)



VIN ou maladie de Bowen

## **VIN indifférenciée**

Papulose extensive, confluente  
ou **VIN confluente**

immunodépression  
virale  
chimiothérapique


Bilan extension :

- sphère anale
- colposcopie






Lichen érosif



Lichen scléreux

**VIN différenciée**



VIN III



## Cancer invasif

- ❑ rare dans le cas de papulose bowénoïde
- ❑ 5 – 20% dans le cas de la maladie de Bowen
- ❑ 4 – 15% dans le cas du lichen scléreux

VIN indifférenciée

VIN III

VIN différenciée



MOI AUSSI,  
PLUS TARD,  
JE SERAI  
MÉDECIN !!

ARRÊTE DE FAIRE  
PLEURER TA MÈRE!

PLANTA